

Упутство за употребу

ALTEOX T PRIMA

Оквашивач за хербициде у облику концентрованог раствора– SL, светло жуте боје

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја:

- Генерички назив: IZODECIL ALKOHOL ETOKSILAT
- Хемијски назив (IUPAC): *alfa-izodecil-Ω-hidroksipoli(oksietilen)*
- Садржај: 900 ± 25 g/l
- CAS број: 61827-42-7

ПРИМЕНА: ALTEOX T PRIMA је додатно средство - оквашивач, који се примењује са хербицидом на бази активне материје tifensulfuron-metil за сузбијање корова у усеву соје, луцерке и кукуруза. Као сурфактант смањује површински напон воде, побољшава квашљивост и бољу дистрибуцију хербицида чиме се постиже боља ефикасност хербицида.

Концентрација примене: 0,2% (20 ml у 10 l воде) у соји, у кукурузу и луцерки.

Утрошак воде: У складу са хербицидом са којим се примењује.

Максималан број третирања у току једне године: У складу са хербицидом са којим се примењује.

СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:

Као оквашивач примењен са хербицидом на бази а.м. tifensulfuron-metil испољава:

Добру ефикасност за следеће коровске врсте:

Једногодишњи широколисни корови: липица теофрастова (*Abutilon theophrasti*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), видовчица црвена (*Anagalis arvensis*), штир блџтави (*Amaranthus blitoides*), пепељуга обична (*Chenopodium album*), пепељуга срцолисна (*Chenopodium hybridum*), коница обична (*Galinsoga parviflora*), лубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*), мртва коприва њивска (*Lamium purpureum*), камилица права (*Matricaria chamomilla*), дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), љутић њивски (*Ranunculus arvensis*), горушица пољска (*Sinapis arvensis*), мишјакиња (*Stellaria media*).

Врсте корова које слабо сузбија:

Једногодишњи широколисни корови: татула обична (*Datura stramonium*), помоћница обична (*Solanum nigrum*), чистац једногодишњи (*Stachys annua*) и боца обична (*Xanthium strumarium*).

Вишегодишњи широколисни корови: попонац њивски (*Convolvulus arvensis*) и паламида њивска (*Cirsium arvense*).

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Додаје се у резервоар прскалице након растварања хербицида.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

Могућност мешања (компатибилност): Може се мешати са свим хербицидима из групе сулфонилуреа којима је неопходан оквашивач.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА:

На биљке (фитотоксичност): Нема фитотоксично деловање и не потпомаже фитотоксичност хербицида са којима се примењује као оквашивач.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера изворишта вода и водоснабдевања), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На водене организме (токсичност): Штетан је за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, језера, бунари, и изворишта вода) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве):

Условљено хербицидом са којим се користи.

РАДНА КАРЕНЦА (време после примене средства у току којег није дозвољен рад у пољу или затвореном простору): Условљено хербицидом са којим се користи.

GHS05 GHS07



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Доводи до тешког оштећења ока. Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Пре употребе прочитати информације на етикети. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице. Избегавати испуштање/ ослобађање у животну средину. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *izodecil alkohol etoksilat*

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ:

Не очекују се штетни ефекти при правилном руковању и адекватним мерама заштите. У случају контакта са кожом неопходно је уклонити одећуни облино испрати кожу водом. У случају инхалације особу изнети на свеж ваздух и по потреби применити вештачко дисање. У случају контакта са очима неопходно је обилно испирање водом (15 мин). Одмах потражити помоћ лекара. Након ингестије/инхалације обавезно се обратити надлежној медицинској установи и показати етикету. Не изазивати повраћање.

Уколико је потребно у свим наведеним случајевима за детаљна упутства обратити се Центру за контролу тровања, ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел. (011) 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица,

наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, одвојено од хране и пића, сточне хране и предмета опште употребе. Чувати под кључем, ван дохвата деце и неупућених особа.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утростити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Растварити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету, насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

РОК УПОТРЕБЕ: 5 године, ако се правилно складишти.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-00821/2009-11 од 22.04.2010. године и измена и допуна решења Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р.Србије бр. 321-01-01134/2011-11 од 23.11.2011. године.

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб
тел.: 011/ 3072-372

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:

GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb

Bosna i Hercegovina

tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-13028/13 od 13.12.2013. godine.