

*Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova*

**Aktivna materija:** kletodim 120 g/l  
**Formulacija:** koncentrat za emulziju (EC)

### Osobine i način delovanja:

- Kletodim spada u grupu cikloheksenona.
- Selektivni herbicid koji se usvaja lišćem i brzo apsorbuje.
- Kreće se naviše i naniže u biljci.
- Brzo dolazi do tačaka rasta gde zaustavlja deobu ćelija.

### Primena:

Preparat **FARGO** koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih korova):

- u usevima **šćerne repe, suncokreta i soje**, tretiranjem posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količinama **0,8-2,0 l/ha**, i to:
- **0,8 l/ha** (8ml na 100 m<sup>2</sup>) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih korova) kao što su **proso** (*Echinochloa crus-galli*) i **muhari** (*Setaria*) i **semenski divlji sirak**.
- **1,2 – 2,0 l/ha** (12 – 20 ml na 100 m<sup>2</sup>) za suzbijanje **divljeg sirka** (*Sorghum halepense*) **iz rizoma**
- **2,0 l/ha** (20 ml na 100 m<sup>2</sup>) za suzbijanje **pirevine** (*Agropyrum repens*) i drugih višegodišnjih travnih korova.

Preparat se primenjuje folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje.  
**Utrošak vode:** 200-400 l/ha.

### Broj tretiranja:

Preparat se u toku godine na istoj površini može primeniti jedan put.

### Napomene:

- Preparat se može koristiti za istu namenu (suzbijanje travnih korova) i u istim količinama koristiti i u: lucerki, krompiru, grašku, paprici, paradajzu, lubenicama, dinjama, krastavcima, crnom i belom luku, pasulju, kupusu i mrkvi, tretiranjem posle nicanja useva kada su korovi u fazi 2-5 listova.
- Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.





**Agrimatco**

**Karenca:**

Obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret, šećernu repu, lucerku i krompir;

30 dana za grašak, papriku, paradajz, dinju, lubenicu, krastavac, crni i beli luk, pasulj, kupus i mrkvu.

**Pakovanje: 1l, 200 ml**