

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Savremena formulacija (uljna disperzija – OD), pojačava delovanje i performanse preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron, i daje veću sigurnost prilikom primene u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Smanjuje površinski napon te je bolja pokrivenost lista korova a time se omogućava i bolje usvajanje preparata. Nije potrebno dodavanje okvašivača, čak ni pri mešanju sa preparatima u WG formulaciji, bezbedniji je prema okolini i direktnim korisnicima. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (ako se primenjuje dvokratno).

Spektar delovanja:

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni (travni) korovi: korovsko proso (*Echinochloa crus-galli*), muhari (*Setaria spp.*), **divlji sirak iz semena i rizoma** (*Sorghum helepense*), plevina obična (*Agropyron repens*)

Jednodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štirevi (*Amaranthus spp.*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), tatula obična (*Datura stramonium*), lubeničarka njivska (*Hybiscus triorum*), bulka obična (*Papaver rhoes*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), ljutić obični (*Ranunculus arvensis*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), boca obična (*Xanthium stumarium*)

Jednokratna primena

- 1,0-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m²), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kukuruz ima 2–6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u fazi 2-6 lista, a divlji sirak 15-20 cm.

Dvokratna primena

- Prvi tretman 0,5 l/ha (5 ml na 100m²) kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
- Drugi tretman 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²), nakon nicanja novih korova

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 lit na 100m²)

Karenca: OVP – kukuruz

Pakovanje: 1l

