

*Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolistih i širokolistih korova u šećernoj repi, lucerki i salati*

**Aktivna materija:** Propizamid (500 g/kg preparata)

**Formulacija:** prah za suspenziju (WP)

**DELOVANJE:** Propizamid je selektivni, sistemični herbicid, koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Inhibira mitozu, odnosno obrazovanje mikrotubula.

#### Primena:

- **Lucerka (zasnovana):** u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (*Cuscuta*), tretiranjem posle prvog košenja
- **Šećerna repa:** u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (*Cuscuta*), tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova, odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu
- **Salata:** u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presadjivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja salate

#### Spektar delovanja

##### Uskolistni korovi:

pirevina (*Agropyron repens*), klasače (*Bromus sp.*), ljljevi (*Lolium sp.*), livadarke (*Poa sp.*), proso (*Panicum sp.*), muhari (*Setaria sp.*), veliki muhar (*Echinochloa crus-galli*), ježevica (*Dactylus glomerata*), svračica (*Digitaria sanguinalis*), divlji ovas (*Avena fatua*)

##### Jednogodišnji širokolistni korovi:

Vilina kosica (*Cuscuta sp.*), pepeljuga (*Chenopodium sp.*), tatala (*Datura stramonium*), pomoćnice (*Solanum sp.*), mrtva kopriva (*Lamium amplexicaule*), rosulja (*Mercurialis annua*), štirovi (*Amaranthus sp.*), bulka (*Papaver rhoeas*), prilepača (*Galium aparine*), bokvica (*Plantago lanceolata*), tušt (*Portulaca oleracea*), dvornici (*Polygonum sp.*), koprive (*Urtica sp.*), gorušica (*Spinapis arvensis*)

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Ne meša se sa drugim preparatima.

**NAPOMENA:** U istoj godini ne smeju se sejati lubenice, dinje, krastavci, tikve i tikvice. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz, sirak, jagode i biljke iz familije Cruciferae.

#### Karenca:

- Salata, lucerka 42 dana
- Šećerna repa OVP

**Pakovanje: 40 g, 1 kg**

