

GLUE PAGE

ПАЖЊА



ХЕМИЈСКИ НАЗИВ: IUPAC-YU:
N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)
nicotinamide
С.А: N-(cyanomethyl)-
4-(trifluoromethyl)-3-
pyridincarboxamide
ДРУГИ НАЗИВ: IBE 220
CAS br.: 158062-67-0
ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ: решење
број: 321-01-1048/2013-11 од
05.11.2013. год.

Број и датум измена решења: 321-01-1456/2015-11
од 26.04.2016. год. 321-01-2587/2013 од 24.09.2015.
год. Издата од стране Управе за заштиту биља,
Министарсва пољопривреде и заштите животне
средине, Републике Србије. Омладинских бригада 1,
Београд.

Рок употребе: 3 године, уз правилно складиштење у
оригинално затвореној и неоштећеној амбалажи.

Класификација и обележавање:

H319 Доводи до јаке иритације ока.

P102 Чувати ван домаћаја деце.

P270 Не јести, не пити и не пушити приликом

руковања овим производом.

P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/
заштитне наочаре/заштиту за лице.

P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво
испирати водом неколико минута. Уклонити
контактна сочива, уколико постоје и уколико је
то могуће учинити. Наставити са испирањем.

P337+P313 Ако иритација ока не пролази: Потражити
медицински савет/мишљење

P501 Одлагање садржаја/амбалаже у складу са
локалном / регионалном / националном /
међународном регулативом.

EUN210 Безбедоносни лист доступан на захтев.

EUN401 Придржавати се упутства за употребу да би
се избегли ризици по здравље људи и животну
средину.

SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту
биља или његовом амбалажом. Уређаје за
примену средства за заштиту биља не чистити у
близини површинских вода. Спречити загађење
одводних канала са пољопривредних површина
и путева.

SPo2 После примене средства за заштиту биља
опрати заштитну одећу.

ПРИМЕНА СРЕДСТВА:

Терреки је инсектицид са системичним и трансламинарним деловањем. Инхибира исхрану инсеката. Користи се у сузбијању лисних ваши у **паприци, парадајзу и краставцу** (*Aphididae*), као и сузбијању зелене ваши (*Aphis pomi*) и кржаве ваши (*Eriosoma lanigerum*) у **јабуци**.

МАКСИМАЛАН БРОЈ ТРЕТИРАЊА: Три пута за јабуку и паприку, два пута за краставац и парадајз на истој површини у току године.

НАЧИН ПРИМЕНЕ И УТРОШАК ВОДЕ: прскање и орошавање уз утрошак воде од 400l/ha (4l на 100m²) за паприку, парадајз и краставац; и 1000l/ha (10l на 100m²) за јабуку.

ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ: На почетку формирања колонија вашију.

КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:

0,12-0,14 kg/ha (1,2-1,4g на 100m²) за паприку
0,06-0,1 kg/ha (0,6-1,0 g на 100 m²) за парадајз и

кроставац
0,08-0,14 kg/ha (0,8-1,4g на 100m²) за јабуку.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

- Компатибилност (могућност мешања): Може се мешати са средствима за заштиту биља на бази следећих супстанци: difenokonazol, mankozeb, deltametrin, lambda- cihalotrin, fluazinam, benomil, krezoksi-metil, sumpor, kaptan, ероксиконазол, fenpropimorf, сјазофамид, bacillus thuringiensis.

- Инкомпатибилност (немогућност мешања): Не препоручује се танк микс, као ни мешање са средствима за заштиту биља алкалне реакције.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: није дозвољено.

Наромена: Забрањена је примена средства за заштиту биља ТЕРРЕКИ у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

КАРЕНЦА: 1 дан за парадајз и краставац, 5 дана за паприку, 21 дан за јабуку.

РАДНА КАРЕНЦА (рад у коме није дозвољен рад људи у пољу и затвореном простору): До сушења депозита.

ТОЛЕРАНЦА-МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): У складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ: Користити заштитну одећу и обућу при раду, придржавати се личне хигијене за и након рада са средством. Држати даље од животних намирница и пића.

ПОСЕБНЕ ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ: Носити заштитну опрему. За време рада не сме се јести, пити нити пушити. По завршетку рада скинути радну одећу и рукавице и добро се опрати водом и сапуном.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

средство може изазвати неке опште симптоме тровања, као што су: мука, малаксалост или главобоља.

Ако доспе у очи: опрати са доста воде или раствором за испирање очију, све до потпуног уклањања хемикалије. Ако се иритација настави потражити лекарску помоћ.

Ако доспе на кожу: Опрати кожу са доста воде и сапуном. Ако се јави иритација потражити помоћ лекара.

Ако се прогута: Испрати уста и попити неколико чаша воде или млека. Не изазивати повраћање. Ако до повраћања дође, испрати уста и поново дати течност. Уколико је особа у несвести не давати ништа преко уста. Сместа потражити лекарску помоћ.

У случају потребе консултовати Центар за контролу тровања Војно медицинске академије (ВМА), Црнотравска 17, Београд, тел. 011/360 84 40 и 011/266 11 22.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ:

Никада не користити празну амбалажу у друге сврхе. Остатке средстава за заштиту биља испразнити из амбалаже у резервоар прскалице. У празну амбалажу додати воду до 1/4 запремине, затим добро испрати амбалажу. Након тога излити воду у резервоар прскалице, а амбалажу оставити да се суши 30 секунди (поступак поновити 3 пута). Тако испрану амбалажу треба одложити на прописани начин. Неутрошене количине средства треба сачувати за наредна третирања у добро затвореној, оригиналној амбалажи уз прописно ускладиштење. Ако се неутрошене количине неће користити за наредна третирања, потребно их је збринути у складу са прописима о поступању са опасним отпадом.