

*Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća*

**Aktivna materija:** Tiofanat metil 700 g/l

**Formulacija:** Vododisperzibilne granule (WG)

### **Osobine i način delovanja:**

Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze  $\beta$ -tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. Usvaja se preko lista i korena.

### **Primena:**

Kod šljive za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (*Monilinia laxa*) u količini od 0,7 kg/ha

### **Vreme primene:**

Preparat Topsin se primenjuje preventivno. Prvo tretiranje početkom cvetanja i drugo tretiranje u fazi punog cvetanja.

### **Utrošak vode:**

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 l/ha.

Tiofanat metil se može koristiti i za druge primene:

- u zasadu breskve za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (*Monilinia laxa*) u količini od 0,7 kg/ha
- u zasadu višnje za suzbijanje sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (*Monilinia laxa*), tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do prevetavanja
- u zasadu jabuke protiv prouzrokovaca skladišnih bolesti poput: *Monilinia sp.*, *Penicillium expansum*, *Ceratostichum gloeosporioides*, *Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*, *Gleosporium fructigenum*, tretiranjem tokom tehnološke zrelosti plodova, najkasnije 15 dana pred berbu a pre ostvarivanja zaraze patogena
- za suzbijanje prouzrokovaca kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (*Didymella applanata*), tretiranjem neposredno posle berbe





- u proizvodnji jagoda koristi se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća jagode (*Mycosphaerella fragariae*), tretiranjem pre i posle cvetanja i neposredno posle berbe.
- u usevu pšenice za suzbijanje *Septoria spp.*, *Fusarium spp.*, *Alternaria spp.*
- u šećernoj repi se primenjuje za suzbijanje *Cercospora beticola*
- u vinovoj lozi i povrću za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (*Botrytis cinerea*).
- za suzbijanje prouzrokovača zelenog uvenuća (*Verticillium albo-atrum*) zalivanjem, posle rasađivanja.

Tiofanat metil ispoljava sekundarno delovanje na nematode korena.

#### **Mogućnost mešanja:**

Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

**Karenca:** Obezbeđena je vremenom primene.

**Pakovanje: 100 g, 500g, 1 kg**



**Agrimatco**